

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka  
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்  
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

**අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2016 අගෝස්තු**  
**கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2016 ஆகஸ்ட்**  
**General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016**

**සංයුක්ත ගණිතය II**  
**இணைந்த கணிதம் II**  
**Combined Mathematics II**

**10 S II**

**පැය තුනයි**  
**மூன்று மணித்தியாலம்**  
**Three hours**

විභාග අංකය

උපදෙස් :

- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ;  
**A කොටස** (ප්‍රශ්න 1 - 10) සහ **B කොටස** (ප්‍රශ්න 11 - 17).
- \* **A කොටස:**  
**සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.** එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ඔබේ පිළිතුරු, සපයා ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. වැඩිපුර ඉඩ අවශ්‍ය වේ නම්, ඔබට අමතර ලියන කඩදාසි භාවිත කළ හැකි ය.
- \* **B කොටස:**  
**ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.** ඔබේ පිළිතුරු, සපයා ඇති කඩදාසිවල ලියන්න.
- \* නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු **A කොටසෙහි** පිළිතුරු පත්‍රය, **B කොටසෙහි** පිළිතුරු පත්‍රයට උඩින් සිටින පරිදි කොටස් දෙක අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- \* ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි **B කොටස පමණක්** විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.
- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි **g** මගින් ගුරුත්වජ ත්වරණය දැක්වෙයි.

**පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.**

| (10) සංයුක්ත ගණිතය II |              |       |
|-----------------------|--------------|-------|
| කොටස                  | ප්‍රශ්න අංකය | ලකුණු |
| <b>A</b>              | 1            |       |
|                       | 2            |       |
|                       | 3            |       |
|                       | 4            |       |
|                       | 5            |       |
|                       | 6            |       |
|                       | 7            |       |
|                       | 8            |       |
|                       | 9            |       |
|                       | 10           |       |
| <b>B</b>              | 11           |       |
|                       | 12           |       |
|                       | 13           |       |
|                       | 14           |       |
|                       | 15           |       |
|                       | 16           |       |
|                       | 17           |       |
|                       | එකතුව        |       |
|                       | ප්‍රතිශතය    |       |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>I පත්‍රය</b>  |  |
| <b>II පත්‍රය</b> |  |
| එකතුව            |  |
| අවසාන ලකුණු      |  |

**අවසාන ලකුණු**

|           |  |
|-----------|--|
| ඉලක්කමෙන් |  |
| අකුරින්   |  |

**සංකේත අංක**


|                     |   |
|---------------------|---|
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක |   |
| පරීක්ෂා කළේ:        | 1 |
|                     | 2 |
| අධීක්ෂණය කළේ:       |   |

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

## A කොටස

1. එක් කෙළවරක්  $O$  අවල ලක්ෂ්‍යයකට ගැට ගසන ලද දිග  $l$  වූ සැහැල්ලු අවිකෘත තන්තුවක අනෙක් කෙළවරෙහි ස්කන්ධය  $m$  වූ අංශුවක් සමතුලිතව එල්ලෙයි. ස්කන්ධය  $2m$  වූ තවත් අංශුවක්  $u$  ප්‍රවේගයකින් තිරස් ව පළමු අංශුව සමග ගැටී එය සමග භාවේ. සංයුක්ත අංශුව චලිතය අරඹන ප්‍රවේගය සොයන්න.

$u = \sqrt{gl}$  නම්, සංයුක්ත අංශුව එහි ආරම්භක මට්ටමෙන් ඉහළට  $\frac{2l}{9}$  උපරිම උසක් කරා ළඟා වන බව පෙන්වන්න.




2. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි, ස්කන්ධය  $m$  වූ  $P$  අංශුවක් හා ස්කන්ධය  $3m$  වූ  $Q$  අංශුවක් සුමට තිරස් මේසයක් මත එක ම සරල රේඛාවක් දිගේ පිළිවෙළින්  $5u$  හා  $u$  වේගවලින් එකිනෙක දෙසට චලනය වේ. ඒවායේ ගැටුමෙන් පසු ව,  $P$  හා  $Q$  එකිනෙකින් ඉවතට පිළිවෙළින්  $u$  හා  $v$  වේගවලින් චලනය වේ.  $u$  ඇසුරෙන්  $v$  සොයා,  $P$  හා  $Q$  අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය  $\frac{1}{3}$  බව පෙන්වන්න.



[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

3.  $P$  අංශුවක්, අවල පඩි පෙළක පඩියක දාරයෙහි වූ  $A$  ලක්ෂ්‍යයක සිට එම දාරයට ලම්බව  $u = \frac{3}{2}\sqrt{ga}$  මගින් දෙනු ලබන  $u$  ප්‍රවේගයකින් තිරස් ව ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබ, ගුරුත්වය යටතේ චලනය වේ. එක් එක් පඩියේ උස  $a$  හා දිග  $2a$  වේ (රූපය බලන්න).  $P$  අංශුව  $A$  ට පහළින් පළමු පඩියේ නොවැදිත් බවත්  $A$  ට පහළින් දෙවන පඩියේ  $A$  සිට  $3a$  තිරස් දුරකින් වැදිත් බවත් පෙන්වන්න.



4.  $R$   $N$  නියත විශාලත්වයකින් යුත් ප්‍රතිරෝධයකට එරෙහිව සෘජු සමතලා පාරක් දිගේ ස්කන්ධය  $M$   $kg$  වූ කාරයක් චලනය වේ. කාරය  $v$   $m\ s^{-1}$  වේගයෙන් චලනය වන මොහොතක දී එහි ත්වරණය  $a$   $m\ s^{-2}$  වේ. මෙම මොහොතේ දී එහි එන්ජිමේ ජවය  $(R + Ma)v$   $W$  බව පෙන්වන්න.

කාරය ඊළඟට එම  $R$   $N$  නියත විශාලත්වයෙන් ම යුත් ප්‍රතිරෝධයකට එරෙහිව එම ජවයෙන් ම ක්‍රියා කරමින් තිරසරව  $\alpha$  කෝණයකින් ආනත වූ සෘජු පාරක ඉහළට  $v_1$   $m\ s^{-1}$  නියත වේගයක් සහිත ව චලනය වේ.

$$v_1 = \frac{(R + Ma)v}{R + Mg \sin \alpha} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$



7.  $A$  හා  $B$  යනු  $\Omega$  නියැදි අවකාශයක සිද්ධි දෙකක් යැයි ගනිමු. සුපුරුදු අංකනයෙන්,  $P(A) = p$ ,  $P(B) = \frac{p}{2}$  හා  $P(A \cup B) - P(A \cap B) = \frac{2p}{3}$  වේ; මෙහි  $p > 0$  වේ.  $p$  ඇසුරෙන්  $P(A \cap B)$  සොයන්න.
- $A$  හා  $B$  ස්වායත්ත සිද්ධි නම්,  $p = \frac{5}{6}$  බව අපෝහනය කරන්න.

8. මල්ලක, පාටින් හැර අන් සෑම අයුරකින් ම සමාන වූ, සුදු බෝල 6 ක් හා කළු බෝල  $n$  අඩංගු වේ. එකකට පසු ව අනෙක ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනයෙන් තොරව බෝල දෙකක් සසම්භාවී ලෙස මල්ලෙන් ඉවතට ගනු ලැබේ. පළමු බෝලය සුදු හා දෙවන බෝලය කළු වීමේ සම්භාවිතාව  $\frac{4}{15}$  වේ.  $n$  හි අගය සොයන්න.

[ගෙවැනි පිටුව බලන්න.

9. 11 ට අඩු ශ්‍රිතයක් නිශ්චල තුනක මධ්‍යන්‍යය 7 වේ. තවත් නිශ්චල දෙකක් ගත් විට නිශ්චල පහේම මධ්‍යන්‍යය 5 වේ. තවද මෙම නිශ්චල පහේ එක ම මාතය 3 වේ. නිශ්චල පහ සොයන්න.

10. 1, 2, 3, 4 හා 5 ලෙස අංක කළ සමාන කේන්ද්‍රික බණ්ඩ පහකින් සමන්විත, හ්‍රමණය වන වෘත්තාකාර ඉලක්ක පුවරුවක් වෙතට ඊතලයක් විදිනු ලැබේ. එක් එක් බණ්ඩයෙහි ඊතලය වදින වාර ගණන පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යාත වගුවෙන් දෙනු ලැබේ; මෙහි  $p$  හා  $q$  නියත වේ.

|           |   |     |     |   |   |
|-----------|---|-----|-----|---|---|
| අංකය      | 1 | 2   | 3   | 4 | 5 |
| සංඛ්‍යාතය | 1 | $p$ | $q$ | 5 | 2 |

ඉහත දත්තවල මධ්‍යන්‍යය හා විචලතාව පිළිවෙළින් 3 හා  $\frac{6}{5}$  බව දී ඇත්නම්,  $p$  හා  $q$  හි අගයන් සොයන්න.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka  
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka

**අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2016 අගෝස්තු**  
**கல்நிப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2016 ஆகஸ்ட்**  
**General Certificate of Education (A-Level) Examination, August 2016**

සංයුක්ත ගණිතය II  
இணைந்த கணிதம் II  
Combined Mathematics II


10 S II

**B කොටස**

\* ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි  $g$  මගින් ගුරුත්වජ ත්වරණය දැක්වෙයි.)

11. (a) අප්‍රකාශයේ කිරීස් ගෙබිමකට  $3h$  උසක් ඉහළින් සවි කර ඇති කුඩා සුමට කප්පියක් මතින් යන සැහැල්ලු අවිනාශ තත්ත්වයක් මගින්, ස්කන්ධය  $m$  වූ  $P$  අංශුවක් ස්කන්ධය  $3m$  වූ  $Q$  අංශුවකට සම්බන්ධ කර ඇත. ආරම්භයේ දී අංශු දෙක ගෙබිමට  $h$  උසකින් තත්ත්ව තදව ඇතිව අල්වා තබා නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ. (යාබද රූපය බලන්න.)  $P$  හා  $Q$  හි චලිතයන්ට වෙන වෙනම නිව්ටන් දෙවෙනි නියමය යෙදීමෙන්, එක් එක් අංශුවේ ත්වරණයෙහි විශාලත්වය  $\frac{g}{2}$  බව පෙන්වන්න.




$t_0$  කාලයකට පසුව  $Q$  අංශුව ගෙබිම සමග ගැටී ක්ෂණිකව නිශ්චලතාවයට පැමිණ, තවත්  $t_1$  කාලයක් නිශ්චලතාවයේ තිබී උඩු අතට චලිතය ආරම්භ කරයි.  $Q$  අංශුව උඩු අතට චලිතය ආරම්භ කරන තෙක්  $P$  හා  $Q$  අංශු දෙකෙහි චලිත සඳහා ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්තාරවල දළ සටහන් වෙන වෙනම අඳින්න.

මෙම ප්‍රස්තාර භාවිතයෙන්,  $t_0 = 2\sqrt{\frac{h}{g}}$  බව පෙන්වා,  $g$  හා  $h$  ඇසුරෙන්  $t_1$  සොයන්න.

$P$  අංශුව ගෙබිමේ සිට  $\frac{5h}{2}$  උපරිම උසකට ළඟා වන බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.


- (b) පළල  $a$  වූ සෘජු ගඟක් ඒකාකාර  $u$  වේගයකින් ගලයි. ගඟ ගලන දිශාවට  $AC$  රේඛාව ලම්භ වන පරිදි  $A$  හා  $C$  ලක්ෂ්‍ය ගඟේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉවුරු දෙකෙහි පිහිටා ඇත. තව ද  $ABC$  සමපාද ත්‍රිකෝණයක් වන පරිදි  $AC$  ගෙන් උඩු ගං අතට  $B$  අචල බෝයාවක් ගඟ මැද සවි කර ඇත. (යාබද රූපය බලන්න.) ජලයට සාපේක්ෂව  $v$  ( $> u$ ) වේගයෙන් චලනය වන බෝට්ටුවක්  $A$  සිට ආරම්භ කර  $B$  වෙත ළඟා වන තෙක් චලනය වේ. ඊළඟට එය  $B$  සිට  $C$  දක්වා චලනය වේ.  $A$  සිට  $B$  දක්වාත්  $B$  සිට  $C$  දක්වාත් බෝට්ටුවේ චලිත සඳහා ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණවල දළ සටහන් අඳින්න.



$A$  සිට  $B$  දක්වා චලිතයේ දී බෝට්ටුවේ වේගය  $\frac{1}{2}(\sqrt{4v^2 - u^2} - \sqrt{3}u)$  බව පෙන්වා,  $B$  සිට  $C$  දක්වා චලිතයේ දී එහි වේගය සොයන්න.


ඒ නමින්,  $AB$  හා  $BC$  පෙත් සඳහා බෝට්ටුව ගන්නා මුළු කාලය  $\frac{a\sqrt{4v^2 - u^2}}{v^2 - u^2}$  බව පෙන්වන්න.

12. (a) රූපයේ දැක්වෙන  $ABC$  ත්‍රිකෝණය, ස්කන්ධය  $2m$  වූ ඒකාකාර කුඤ්ඤයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරහා වූ සිරස් හරස්කඩකි.  $AB$  රේඛාව එය අයත් මුහුණතෙහි උපරිම බෑවුම් රේඛාවක් වන අතර  $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$  වේ.  $BC$  අයත් මුහුණත රළු කිරීස් ගෙබිමක් මත ඇතිව කුඤ්ඤය තබා ඇත.  $AB$  අයත් මුහුණත සුමට වේ. ස්කන්ධය  $m$  වූ අංශුවක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි  $AB$  මත අල්වා තබා පද්ධතිය නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ. කුඤ්ඤය  $BC$  හි දිශාවට චලනය වන බවත් ගෙබිම මගින් කුඤ්ඤය මත ඇති කරන සර්ෂණ බලයෙහි විශාලත්වය  $\frac{R}{6}$  වන බවත් දී ඇත; මෙහි  $R$  යනු ගෙබිම මගින් කුඤ්ඤය මත ඇති කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වයයි.  $m$  හා  $g$  ඇසුරෙන්,  $R$  නිර්ණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් වන සමීකරණ ලබා ගන්න.



[අවම වශයෙන් පිටු 2 බලන්න.]

(b) රූපයේ දැක්වෙන  $OAB$  යනු  $OA$  සිරස් ව ඇති,  $O$  කේන්ද්‍රයෙහි  $\frac{\pi}{6}$  කෝණයක් ආපාතනය කරන අරය  $a$  වූ වෘත්ත ඛණ්ඩයකි. එය, ස්වකීය අක්ෂය තිරස් ව සවි කර ඇති සුමට සිලින්ඩරාකාර ඛණ්ඩයක අක්ෂයට ලම්භ හරස්කඩකි.  $B$  හි සවි කර ඇති කුඩා සුමට කප්පියක් මතින් යන සැහැල්ලු අවිනාශ තන්තුවක එක් කෙළවරක් ස්කන්ධය  $3m$  වූ  $P$  අංශුවකට ඇඳා ඇති අතර එහි අනෙක් කෙළවර ස්කන්ධය  $m$  වූ  $Q$  අංශුවකට ඇඳා ඇත. ආරම්භයේ දී  $P$  අංශුව  $A$  හි අල්වා ඇති අතර  $Q$  අංශුව  $O$  හි තිරස් මට්ටමේ නිදහසේ එල්ලෙයි. තන්තුව තදව ඇතිව, මෙම පිහිටීමෙන්, පද්ධතිය නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ.



$OP$  උඩු අත් සිරස සමඟ  $\theta$  ( $0 < \theta < \frac{\pi}{6}$ ) කෝණයක් සාදන විට  $2a\dot{\theta}^2 = 3g(1 - \cos \theta) + g\theta$  බව හා තන්තුවේ ආතතිය  $\frac{3}{4}mg(1 - \sin \theta)$  බව පෙන්වා,  $P$  අංශුව මත අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න.

13. ස්වාභාවික දිග  $a$  හා ප්‍රත්‍යාස්ථකා මාපාංකය  $4mg$  වූ සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක එක් කෙළවරක් අවල  $O$  ලක්ෂ්‍යයකට ද අනෙක් කෙළවර ස්කන්ධය  $m$  වූ  $P$  අංශුවකට ද ගැට ගසා ඇත.  $P$  අංශුව,  $O$  හි නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ.  $P$  අංශුව  $A$  ලක්ෂ්‍යය පසු කර යන විට එහි ප්‍රවේගය සොයන්න; මෙහි  $OA = a$  වේ.

තන්තුවේ දිග  $x$  ( $x \geq a$ ) යන්න  $\ddot{x} + \frac{4g}{a} \left( x - \frac{5a}{4} \right) = 0$  සමීකරණය සපුරාලන බව පෙන්වන්න.

$X = x - \frac{5a}{4}$  ලෙස ගෙන, ඉහත සමීකරණය  $\ddot{X} + \omega^2 X = 0$  ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි  $\omega$  ( $> 0$ ) නිර්ණය කළ යුතු නියතයකි.

$\dot{X}^2 = \omega^2 (c^2 - X^2)$  බව උපකල්පනය කරමින්, මෙම සරල අනුවර්තී චලිතයෙහි විස්තාරය වන  $c$  සොයන්න.

$P$  අංශුව ළඟා වන පහළ ම ලක්ෂ්‍යය  $L$  යැයි ගනිමු.  $A$  සිට  $L$  දක්වා චලනය වීමට  $P$  මගින් ගනු ලැබූ කාලය  $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{a}{g}} \left\{ \pi - \cos^{-1} \left( \frac{1}{3} \right) \right\}$  බව පෙන්වන්න.

$P$  අංශුව  $L$  හි තිබෙන මොහොතේ දී ස්කන්ධය  $\lambda m$  ( $1 \leq \lambda < 3$ ) වූ තවත් අංශුවක් සිරුවෙන්  $P$  ට ඇඳුනු ලැබේ. ස්කන්ධය  $(1 + \lambda)m$  වූ සංයුක්ත අංශුවේ චලිත සමීකරණය  $\ddot{x} + \frac{4g}{(1 + \lambda)a} \left\{ x - (5 + \lambda) \frac{a}{4} \right\} = 0$  බව පෙන්වන්න.

සංයුක්ත අංශුව,  $(3 - \lambda) \frac{a}{4}$  විස්තාරය සහිත පූර්ණ සරල අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.

14. (a)  $O$  මූලයක් අනුබද්ධයෙන්  $A$  හා  $B$  ලක්ෂ්‍ය දෙකක පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙළින්  $\mathbf{a}$  හා  $\mathbf{b}$  වේ; මෙහි  $O, A$  හා  $B$  ඒක රේඛීය නොවේ.  $C$  යනු  $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OB}$  වන පරිදි පිහිටි ලක්ෂ්‍යය ද  $D$  යනු  $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$  වන පරිදි පිහිටි ලක්ෂ්‍යය ද යැයි ගනිමු.  $\mathbf{a}$  හා  $\mathbf{b}$  ඇසුරෙන්  $\overrightarrow{AC}$  හා  $\overrightarrow{AD}$  ප්‍රකාශ කර,  $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AC}$  බව පෙන්වන්න.

$P$  හා  $Q$  යනු පිළිවෙළින්,  $AB$  හා  $OD$  මත  $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$  හා  $\overrightarrow{OQ} = (1 - \lambda) \overrightarrow{OD}$  වන පරිදි පිහිටි ලක්ෂ්‍ය යැයි ගනිමු; මෙහි  $0 < \lambda < 1$  වේ.  $\overrightarrow{PC} = 2 \overrightarrow{CQ}$  බව පෙන්වන්න.

- (b)  $ABCD$  සමාන්තරාස්‍රයක  $AB = 2$  m හා  $AD = 1$  m යැයි ද  $\hat{BAD} = \frac{\pi}{3}$  යැයි ද ගනිමු. තව ද  $CD$  හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය  $E$  යැයි ගනිමු. විශාලත්ව නිව්ටන 5, 5, 2, 4 හා 3 වූ බල පිළිවෙළින්  $AB, BC, DC, DA$  හා  $BE$  දිශේ අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන දිශාවන්ට ක්‍රියා කරයි. ඒවායේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය  $\overrightarrow{AE}$  ට සමාන්තර බව පෙන්වා එහි විශාලත්වය සොයන්න.


සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියා රේඛාව  $B$  සිට  $\frac{3}{2}$  m දුරක දී දික්කරන ලද  $AB$  ට හමුවන බවත් පෙන්වන්න.

දැන්  $C$  හරහා ක්‍රියා කරන අමතර බලයක් ඉහත බල පද්ධතියට එකතු කරනු ලබන්නේ නව පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය  $\overrightarrow{AE}$  දිශේ වන පරිදි ය. අමතර බලයේ විශාලත්වය හා දිශාව සොයන්න.

[තවවැනි පිටුව බලන්න.

15.(a) එක එකක බර  $w_1$  වූ සමාන ඒකාකාර දඬු හතරක්,  $ABCD$  රොම්බසයක් සෑදෙන පරිදි, ඒවායේ අන්තවල දී සුමට ලෙස සන්ධි කර ඇත.  $\hat{BAD} = 2\theta$  වන පරිදි  $BC$  හා  $CD$  හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය සැහැල්ලු දණ්ඩක් මගින් යා කර ඇත.  $B$  හා  $D$  එක් එක් සන්ධිය සමාන  $w_2$  භාර දරයි. පද්ධතිය,  $A$  සන්ධියෙන් සමමිතික ලෙස ඵල්ලෙමින්, සැහැල්ලු දණ්ඩ තිරස් ව ඇතිව සිරස් තලයක සමතුලිතතාවයේ පවතියි. සැහැල්ලු දණ්ඩෙහි තෙරපුම  $2(2w_1 + w_2) \tan \theta$  බව පෙන්වන්න.

(b) යාබද රූපයෙන්, අන්තවල දී සුමට ලෙස සන්ධි කළ  $AB, BC, CD, AC$  හා  $AD$  සැහැල්ලු දඬු පහකින් සමන්විත රාමු සැකිල්ලක් නිරූපණය වේ.  $AC = CB$  හා  $\hat{BAC} = 30^\circ = \hat{ADC}$  බව දී ඇත. රාමු සැකිල්ල  $D$  හි දී සුමට ලෙස අසව් කර ඇත.  $B$  සන්ධියේ දී  $W$  බරක් ඵල්ලා  $AB$  තිරස් ව ද  $AD$  සිරස් ව ද ඇතිව රාමු සැකිල්ල සිරස් තලයක සමතුලිතව තබා ඇත්තේ  $A$  හි දී ක්‍රියා කරන විශාලත්වය  $X$  වූ තිරස් බලයක් මගිනි. බෝ අංකනය භාවිතයෙන්  $B, C$  හා  $A$  සන්ධි සඳහා ප්‍රත්‍යාබල සටහන් එක ම රූපයක අඳින්න. ඒ නමින්,  $X$  හි අගය හා සියලු දඬුවල ප්‍රත්‍යාබල, ආතති හා තෙරපුම් විශයෙන් වෙන් කර දක්වමින් සොයන්න.



16. අරය  $r$  හා  $O$  කේන්ද්‍රය වූ ඒකාකාර අර්ධ වෘත්තාකාර ආස්තරයක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය  $O$  සිට  $\frac{4r}{3\pi}$  දුරකින් ඇති බව පෙන්වන්න.

යාබද රූපයේ දැක්වෙන පරිදි,  $L$  ඒකාකාර තල ආස්තරයක් සාදා ඇත්තේ  $ABCD$  සෘජුකෝණාස්‍රයක්  $PQRS$  සමවකුරුමයකට  $DC$  හා  $PQ$  ඒවායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය සම්පාත වෙමින් එක ම රේඛාවේ පිහිටන පරිදි දෘඪ ලෙස සව් කර,  $RS$  හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන  $T$  හි කේන්ද්‍රය ඇති අරය  $\frac{a}{2}$  වන  $XYZ$  අර්ධ වෘත්තාකාර පෙදෙසක් ඉවත් කිරීමෙනි.  $AB = a$  හා  $AD = PQ = 2a$  බව දී ඇත.  $L$  ආස්තරයෙහි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සමමිතික අක්ෂය මත,  $RS$  සිට  $ka$  දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න; මෙහි  $k = \frac{238}{3(48 - \pi)}$  වේ.

යාබද රූපයේ දැක්වෙන පරිදි,  $L$  ආස්තරය තිරසරව කෝණයකින් ආනත වූ රළු තලයක් මත ස්වකීය තලය සිරස් ව ද  $P$  ලක්ෂ්‍යය  $S$  ට පහළින් පිහිටන පරිදි  $PS$  දාරය උපරිම බෑවුම් භේදාවක් මත ද ඇතිව සමතුලිතව පිහිටයි.  $\tan \alpha < (2 - k)$  හා  $\mu \geq \tan \alpha$  බව පෙන්වන්න; මෙහි  $\mu$  යනු ආස්තරය හා ආනත තලය අතර සර්ෂණ සංගුණකයයි.

