

# පිළිතුරු Biology 2006

@AL\_Past\_Papers

අ. පො. ස. (පාසල් පෙළ) විභාගය - 2006 අප්‍රේල් - 5වන විද්‍යාව I - තාදේස විකල්ප

|     |   |     |   |     |   |     |     |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|
| 01. | 4 | 11. | 4 | 21. | 3 | 31. | 5   | 41. | 3 | 51. | 1 |
| 02. | 3 | 12. | 2 | 22. | 1 | 32. | all | 42. | 1 | 52. | 2 |
| 03. | 3 | 13. | 2 | 23. | 5 | 33. | 5   | 43. | 3 | 53. | 5 |
| 04. | 4 | 14. | 1 | 24. | 5 | 34. | 5   | 44. | 2 | 54. | 1 |
| 05. | 3 | 15. | 1 | 25. | 3 | 35. | 2   | 45. | 5 | 55. | 3 |
| 06. | 5 | 16. | 3 | 26. | 5 | 36. | 1   | 46. | 3 | 56. | 1 |
| 07. | 1 | 17. | 1 | 27. | 3 | 37. | 4   | 47. | 1 | 57. | 4 |
| 08. | 5 | 18. | 2 | 28. | 3 | 38. | 5   | 48. | 2 | 58. | 3 |
| 09. | 5 | 19. | 4 | 29. | 5 | 39. | 2   | 49. | 2 | 59. | 4 |
| 10. | 3 | 20. | 2 | 30. | 3 | 40. | 3   | 50. | 5 | 60. | 1 |

නිවැරදි ප්‍රතිචාරය

**A කොටස (විෂයගත රචනා)**

01. (A) (i) a. තයිමින් (Thymine) b. සයිටොසින් (Cytosine) c. ගුවනින් (Guanine)  
d. ඇඩිනින් (Adenine) x. පොස්පේට් / පොස්පොරික් අම්ලය y. ඩිමත්සිරයිබෝස්
- (ii) (1) තොරතුරු තැන්පත් කිරීම. (2) ස්වයංප්‍රතිවලිත විය හැකි වීම. (3) විකෘති ඇති වීමට ඇති හැකියාව
- (iii) (1) සත්ත්ව අනුක්‍රමික කේන්ද්‍රස්‍රසාරණය (2) ජෛව විද්‍යාපරිණිතය / විද්‍යුත් විභවනය
- (iv) H බන්ධන බිඳේ. / දාම දෙක වෙන් වේ. / තනි දාම බවට පත් වේ.
- (B) (i) (1) රයිබොසෝම (2) මයිටොකොන්ඩ්‍රියා (3) හරිතලව (4) කෙල ජලාස්මය
- (ii) කැප්ටිය / කැප්ටිකාව
- (iii) **DNA**  
(1) ද්විත්ව දාමයකි.  
(2) ඩිමත්සිරයිබෝස් සිනි ඇත.  
හෝ  
ඩිමත්සිරයිබො නියුක්ලියෝටයිඩ ඇත.  
(3) තයිමින් ඇත. / පුරයිල් නැත.
- RNA**  
තනි දාමයකි.  
රයිබෝස් සිනි ඇත.  
හෝ  
රයිබොනියුක්ලියෝටයිඩ ඇත.  
තයිමින් නැත. / පුරයිල් ඇත.
- (iv) (1) රයිබොසෝම තනයි.  
(2) DNA සිට රයිබොසෝම වෙත ප්‍රවේණි පණිවිඩය ගෙන යයි.  
(3) ඇමිනෝ අම්ල රයිබොසෝම කරා පරිවහනය කරයි.  
(4) සමහර වෛරස් වල ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යය තනයි. (මින් ඕනෑම 3 ක්)
- (C) (i) (1) නයිට්‍රජන් හේම (2) කාබන් 5 සිනි / පෙන්ටෝස් සිනි  
(3) පොස්පේට් / පොස්පොරික් අම්ලය
- (ii) **නියුක්ලියෝටයිඩය**  
(1) ATP/ADP/AMP  
(2) NAD/ NADP  
(3) FMN/ FAD
- කෘත්‍යය**  
ශක්තිය ගබඩා කිරීම / නිදහස් කිරීම.  
H වාහක / H ප්‍රතිග්‍රාහක / ඔක්සිහාරක ද්‍රව්‍යයකි.  
e වාහක / e ප්‍රතිග්‍රාහක  
H වාහක / ඔක්සිහාරක ද්‍රව්‍යයකි.  
e වාහක / e ප්‍රතිග්‍රාහක
- (iii) (i) DNA (2) ප්‍රෝටීන් (හිස්ටෝන)
- (iv) 23
- (D) (i) (1) ජානයක / DNA / RNA හි (අනුයාත) එකලක පිහිටන හේම / නියුක්ලියෝටයිඩ 3 ක්  
වඩාත් සුදුසු :- m - RNA හි එකලක පිහිටන හේම / නියුක්ලියෝටයිඩ තුනක්  
(2) ඒවා ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණයේ දී ඒ ඒ ඇමිනෝ අම්ල සංකේතවත් කරයි.
- (ii) ජානයක නියුක්ලියෝටයිඩ (හේම) අනුපිළිවෙල මගින් ප්‍රෝටීනයේ ඇමිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙල තීරණය කරයි.
- (iii) වෙනත් විශේෂයක ජාන ඇතුළත් කරනු ලැබූ ජීවීන්
- (iv) (1) මෘධෙ නිෂ්පාදනයේ දී උදා :- ඉන්සියුලින්, G.H, හෙපරින්, ඉන්ටර්ලොරොන්  
(2) වැඩි පලදාවක් ඇති හෝග ශාක / සතුන් නිපදවීම උදා :- වී, කිරිඳු, මස්, කිරි  
(3) කාර්මිකව වැදගත් එන්සයිම නිෂ්පාදනය උදා :- ඇමයිලේස්, ප්‍රෝටියේස්, පෙන්ටිනේස්, පෙන්ටිඩේස්, ශ්‍රේෂ්ඨකෝස් ඔක්සිඩේස්

02. (A) (i) පොදු ලක්ෂණ ගණනාවක් දරන එක් ලක්ෂණයකින් හෝ කිහිපයකින් අන් විශේෂ වලින් වෙන් වන අතර අභිජනනයෙන් සරු ජනිතයින් බිහි කරන ජීවීන් කාණ්ඩයක් විශේෂයක් ලෙස හැඳින්වේ.
- (ii) ආත්‍රාපෝධා / ඉන්සෙක්ටා
- (iii) ජීවීන් වර්ගීකරණයේ දී යොදා ගන්නා කාණ්ඩයකි. සමාන ලක්ෂණ සහිත ජීවීන් එම කාණ්ඩයකට ඇතුළත් කර ගනී.
- (iv) විශේෂය, සත්‍ය, කුලය, ගෝත්‍රය, වර්ගය, වංශය, රාජධානිය
- (B) (i) යම් ජීව විශේෂයක් පොළව මතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වීම.
- (ii) (1) නව විශේෂ වලට ඉඩ සැපයීම. (2) පරිනාමයට ඉවහල් වීම.
- (iii) 

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| සත්ත්ව කාණ්ඩය                       | තණ්ඩ වූ අවධිය |
| (1) ට්‍රිලොබයිටාට්‍රන් (Trilobiten) | පර්මියන්      |
| (2) ඇමෝනියාට්‍රන් (Ammonites)       | ක්‍රිටේසියස්  |
| (3) ඩයිනොසරයන් (Dinosaurs)          | ක්‍රිටේසියස්  |
- (iv) පොළව ක්ෂුද්‍ර භූගත (උල්කාරාත) හා හැවීම.
- (C) (i) (1) කුන්දා (2) කේතුධර වනාන්තර / වවන
- (3) සොම්ය කලාපීය පහතරළු වනාන්තර (4) නිවර්තන සහන ශීලි වනාන්තර
- (5) නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර / තෙත් සදාහරිත වනාන්තර (6) තණ බිම් / සවානා
- (7) කාන්තාර
- (8) සොම්ය කලාපීය සදාහරිත වනාන්තර / දෘඩපත්‍රී අරඹ.
- (ii) කුන්දා
- (iii) (1) පහත රට වර්ෂා වනාන්තර / තෙත් සදාහරිත වනාන්තර
- (2) විශලී මිශ්‍ර, සදාහරිත වනාන්තර / මෝසම් වනාන්තර
- (3) කඳුකර වනාන්තර
- (4) ලද කැලෑ / කවු පදුරු
- (5) සවානා / තණබිම් / පහත / දළු මත් ඕනෑම 4 ක් ලිවිය හැක
- (iv) (1) ගංගා / ඇල දොළ (2) සංවායක / පොකුණු / වැව්
- (3) විල්ල (4) විශුරු බිම් / ගොතොරු බිම්
- (D) (i) එක් එක් පරිසර පද්ධතියක ප්‍රමාණවත් බිමක් සංරක්ෂණය.
- (ii) පරිබාහිර සංරක්ෂණය  
විශේෂයක් ඔවුන්ගේ ස්වභාවික පරිසරයෙන් ඉවත් කර පැවැත්ම හා ප්‍රජනනය සිදුවන ඔවුන්ගේ තනතුරු වන පොදු විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද පරිසරයක් තුළ සංරක්ෂණය කිරීම.
- ස්ථානීය සංරක්ෂණය  
විශේෂ ආරක්ෂා කරමින් ස්වභාවික පරිසරයේ ප්‍රජනනය සිදුවීමට පහසුකම් සැලසීම.
- (iii) ජාන සම්පත් බැංකු / බීජ බැංකු / ජාන බැංකු / උද්භිද දර්ශන සත්ත්ව දර්ශන භෞමික විද්‍යාත්මක සංරක්ෂණ කැස්බෑ පුරාතන භූමි / ඔසු ලයන් (ඕනෑම 2 ක්)
- (iv) දැඩි ස්වභාවික ආරක්ෂිත කලාප / ආරක්ෂක කලාප / අභය භූමි ස්වභාවික රක්ෂිත රාශික වනෝද්‍යාන නැවත හඳුන්වාදීම (ඕනෑම 2 ක්)

03. (A) (i) පරිවෘත්තීය ක්‍රියා නිසා දේහය තුළ ඇතිවන අපද්‍රව්‍යය ඉවත් කිරීම.

(ii) මලපහ කිරීම :- නොදිරවූ ආහාර ඉවත් කිරීම.  
බහිෂ්චාරය :- දේහය තුළ ඇති වූ අපද්‍රව්‍යය ඉවත් කිරීම.

(iii) CO<sub>2</sub> හා යුරියා

(iv) (1) උරග / රෙපටිලියා

(2) පක්ෂි / ආවේස්

(3) කෘමි / ඉන්සෙක්ටා

(v) වෘක්කිකා

- (vi) (1) සතුන්ගේ වාසස්ථානය / සත්ත්වයාට ලබාගත හැකි ජල ප්‍රමාණය  
(2) ජලය හානි වීම පාලනය කළ හැකි මට්ටම  
(3) සමහර එන්සයිම කිසිම හෝ නොමැති වීම. (මින් ඔනෑම 2 ක්)
- (B) (i) (1) උදර කුහරයේ (2) අපර බිත්තිය අසල (3) කෂේරුව දෙපස  
(4) උරස් හා කටි කෂේරුකා අතර ප්‍රදේශයේ (5) ප්‍රති උදරවිජ්‍යාව පිහිටයි. (මින් තරුණ 4 ක් ප්‍රමාණවත්)
- (ii) (1) රුධිර pH යාමනය කිරීම. (2) රුධිර පීඩනය යාමනය  
(3) රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය  
(4) හෝමෝන නිපදවීම / අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම / රිනින් හා එරිත්‍රොපොයිටින් නිපදවීම.  
(5) රුධිරයේ රසායනික සංයුතිය යාමනය  
(6) රුධිරයේ ජල ප්‍රමාණය යාමනය  
(7) නයිට්‍රජන් අපද්‍රව්‍යය බැහැර කිරීම. (මින් ඔනෑම 3 ක්)
- (iii) (1) ගුවිවිකාවේ අපවාහි ධමනිකාවේ විෂකම්භය අභිවාහි ධමනිකාවේ විෂකම්භයට වඩා අඩුවීම මගින්  
(iv) විදුර සංවලිත නාලිකාවේ  
(v) රුධිර ආශ්‍රාති පීඩනය වැඩිවීම / ලවන සාන්ද්‍රණය වැඩිවීම / රුධිරයේ ජල ප්‍රමාණය අඩු වීම.
- (C) (i) දේහයේ ජල ප්‍රමාණය නොතකා වාස්තූන්‍යවෙන් ජලය ප්‍රතිශෝෂණය වීම.  
(ii) අවිදුර සංවලිත නාලිකාවේ.  
(iii)  $H^+$ ,  $NH_4^+$ ,  $K^+$   
(iv) (1) රිනින් ශ්‍රාවය / නිෂ්පාදනය කිරීම.  
(2) රුධිර ගත  $Na^+$  ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම.  
(3) රුධිර පීඩනය යාමනය / රුධිර පරිමාව යාමනය. (මින් ඔනෑම 2 ක්)  
(v) කැල්සියම් ඔක්සලේට් හා කැල්සියම් පොස්පේට් අවශෝෂණය වීම වැළැක්වීම.
- (D) (i) ප්‍රරෝහනය වන බීජ දත්තා බරක් ජලාස්කූලව දමන්න. KOH / NaOH සහිත කුඩා තලයක් එයට ඇතුළු කරන්න. උපකරණය රූපයේ පරිදි අවවා කරාමය විවෘත කොට A/B තලයේ ද්‍රව මට්ටම සම කර ලකුණු කර ගන්න. නියමිත කාලයකට පසු තලයේ ද්‍රව මට්ටම නැවත සලකුණු කරන්න. මේ මගින් ලැබෙන පරිමා වෙනස භාවිතා කළ  $O_2$  පරිමාව වේ. ඉන්පසු පරිමාව අඩුවීම මගින් බීජ ඒකක බරකට ඒකක කාලයක් තුළ  $O_2$  භාවිතා කරන සීඝ්‍රතාව ලැබේ.  
$$\text{බීජ} \times \text{කාලය}$$
  
(ii) ඉහත බීජ සාම්පලය KOH / NaOH සහිතව මුල් ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න. ඉන්පසු KOH/NaOH ඉවත් කොට තැබූ එය කරන්න. එහිදී ලැබෙන පරිමා වෙනස =  $O_2$  පරිමාව -  $CO_2$  පරිමාවයි. මේ අනුව  $CO_2$  පරිමාව = KOH ඇති විට පරිමා වෙනස - KOH නැතිවිට පරිමා වෙනස ඉන්පසු 
$$\frac{CO_2 \text{ පරිමාව}}{\text{බීජ} \times \text{කාලය}}$$
 ගණනය කරන්න. මේ මගින්  $CO_2$  ප්‍රදාහන සීඝ්‍රතාව ලැබේ.  
(iii)  $RQ \text{ (ශ්වසන ලබ්දිය)} = \frac{\text{විවෘත } CO_2 \text{ පරිමාව}}{\text{භාවිතා කළ } O_2 \text{ පරිමාව}}$   
එකම බීජ සාම්පලය සමාන කාලයකදී භාවිතා කළ  $O_2$  පරිමාව හා පිටකළ  $CO_2$  පරිමාව ලබාගෙන ඉහත සූත්‍රය ආදේශ කර RQ අගය ලබා ගන්න.  
(iv) \* 1.0  
\* කාබෝහයිඩ්‍රේට් ශ්වසනයට භාජනය වන විට භාවිතා කළ  $O_2$  වලට සමාන පරිමාවක්  $CO_2$  පිට කරනු ලබන නිසා RQ අගය එක වේ. එනම්  $RQ = \frac{CO_2}{O_2} = 1$  වේ.  
(v) 1.0 ට අඩු වේ. / 0.7 ක් පමණ වේ. එබැවින් වල සංචිත ආහාර කෙල් වේ. කෙල් / ලිපිඩ් ශ්වසන උපක්‍රමය වන විට පිටවන  $CO_2$  පරිමාව භාවිතා වන  $O_2$  පරිමාවට වඩා අඩු වීම මීට හේතු වේ.

පැ. ස. - ප්‍රශ්න අංක 03(D)(i) සඳහා ශ්වසන සීඝ්‍රතාව ලබා ගැනීම සඳහා අවසාන ගණනය කිරීමට බීජ බර යොදා ගත යුතු වේ.  
(ii) කොටස සඳහා ද එකම බීජ සාම්පලය යොදා ගන්නා නමුත් අසා ඇත්තේ  $CO_2$  මුදා හරිනු සීඝ්‍රතාවය සොයන්න.  
යන්න නිසා, එයටද බීජ බර යොදා ගත යුතුය.

04. (A) (i) (a) ව්‍යාධිජනකකාරී :-

ආසාදනය මගින් ධාරකයා තුළ රෝගයක් හට ගැන්වීමට ජීවීන්ට ඇති හැකියාව

(b) ආක්‍රමණශීලීකාරී :-

ධාරක පටක තුළට ඇතුළු වීමේ හැකියාව හා ඒ තුළ ගුණනය වීමේ හැකියාව

(c) බුලත්කර්ෂකකාරී :-

විෂ නිපදවීම මගින් සෛල තුළ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය බිඳ දැමීමට ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්ට ඇති හැකියාව

(ii) එන්සයිමය

කෘත්‍යය

\* පොස්පොලයිපේස්

සත්ත්ව සෛල පටල වල පොස්පොලයිපිඩ සංඝට්ටන විනාශ කරයි

\* ලෙසිතිනේස්

සෛල පටලයේ ලිපිඩ වල ලැසිතින් ජල විච්ඡේදනය කරයි.

\* හයිඩ්‍රොෆොබිස්

සෛල අතර හයලොරොනික් අම්ල බදාම් ආක්‍රමනය කර දෙපැත්ත විනාශ කරයි.

(ඕනෑම 2 ක් ලිවිය හැක.)

(iii) වෙනත් ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියා නිෂේධනයට හේතුවන ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන් නිපදවන රසායනික සංයෝග වේ.

(iv) ප්‍රතිජීවකයේ නම

ක්‍රියා කරන අන්දම

\* පෙනිසිලින්

බැක්ටීරියා සෛල බිත්තිය සංස්ලේෂණය නිෂේධනය කරයි.

\* ටෙට්‍රසයික්ලින්  
පොලිමික්සින්

බැක්ටීරියා ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණය නිෂේධනය කරයි.

බැක්ටීරියා සෛල පටල හානි කරයි.

\* ග්‍රිසියොෆිල්වින්

සෛල පටල විනාශ කරයි.

\* එරිත්‍රාමයිසින්

බැක්ටීරියා ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණය නිෂේධනය කරයි.

(ඕනෑම 2 ක් ලිවිය හැක.)

(B) (i) \* පළිබෝධක ජීවන චක්‍රය

\* හැසිරීම / වාසස්ථානය (පළිබෝධකයාගේ)

\* පරිසර තත්ත්වයන්

\* සංඛ්‍යාව වඩාත්ම බහුල කාලය

\* විශදම / ආර්ථික තත්ත්වය

\* විෂ බව / පරිසර හානිය / පරිසර දූෂණ මට්ටම

(ඕනෑම හතරක් ලිවිය හැක.)

(ii) ක්‍රමය

උදාහරණ

(1) සම්ප්‍රදායික / පාරම්පරික ක්‍රම

බෝග මාරුව/උතුල් බෝග වගා කිරීම/ ජල පාලනය අධික ඇඟිදීම / සිසුම් / සනිපාරකක ක්‍රම / කප්පාදු කිරීම.

කෘමිනාශක භාවිතය

(2) රසායනික ක්‍රම

ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීම / ජාන කාන්තා ක්‍රම

(3) ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රම

රෝග කාරක/ ආරක්ෂක/ විකර්ෂක යෙදීම / ස්වභාවික සංවිලෝමයන්, පර පෝෂිත යෙදීම

(iii) සුදුසු / අදාළ පරිදි ක්‍රම එකකට වැඩි ගණනක් සංයෝජනයෙන් පළිබෝධ පාලනය

(C) (i) (1) මෝරා

(2) තෙල්ගොඩයා

(3) නිලාපියා

(4) සාමාන්‍ය කාපයා, කුරුල්ල

A කිරුව

B කිරුව

(ii) • නික්ෂලේප ද්‍රව්‍ය, සත්ත්ව ජලවාංග, කුඩා සතුන්

*Cirrhinus merigala*

• නික්ෂලේප ද්‍රව්‍ය, විශාල ජලජ ශාක

*Labeo rohita / catla Catla*

• නික්ෂලේප ද්‍රව්‍ය, විශාල ජලජ ශාක, කුඩා සතුන්

*Oreochromis mossambicus*

• කුඩා සතුන්, ජලවාංග

*Oreochromis niloticus*

(iii) SEMBV හා MBV

(iv) (1) බිත්තර දැමීම ප්‍රේරණය කිරීම / ප්‍රේරිත අභිජනනය / අක්ෂි වෘත්තය කපා දැමීම.

(2) සංජේවනය.

(3) පැටවුන් හදා වඩා හැනීම / ලපටියන් රැක බලා ගැනීම.

(D) (i) පෝෂණ / රෝපණ මාධ්‍යයක් තුළ ජීවානුභවිත භක්ෂවියන් යටතේ පවත වර්ධනය කිරීම.

- (ii) \* හෝමෝන / ඔක්සිජන් / සයිටොකයිනින් \* සීනි / සුක්රෝස්  
\* විවෘත \* ඒශාර්

(මින් ඔනෑම 2 ක් ලිවිය හැක.)

- (iii) \* කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයකින් විශාල සාමාජික සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත හැකිවීම.  
\* දේශගුණික බලපෑම් වලට ලක් නොවීම.  
\* ඉක්මනින් ශාක ප්‍රචාරනය කළ හැකි වීම.  
\* ප්‍රවේණි ප්‍රභේදන වලින් තොරව ප්‍රජනනය ලබා ගත හැකි වීම.  
\* රෝග රහිත පැළ ලබා ගත හැකි වීම.

(මින් ඔනෑම 4 ක් ලිවිය හැක.)


| (iv) | ක්‍රමය                  | බෝග ශාකය                      |
|------|-------------------------|-------------------------------|
| *    | බද්ධ කිරීම              | අඹ / දොඩම් / රවුටන් / ආදී ... |
| *    | ශාක කැබලි මුල් ඇද්දවීම  | තේ / දෙහි                     |
| *    | රයිසෝම යොදා ගැනීම       | කෙසෙල්                        |
| *    | කෝම යොදා ගැනීම          | ගහල                           |
| *    | බල්බයන් යොදා ගැනීම      | පුණු                          |
| *    | ස්කන්ධ ආකන්ද යොදා ගැනීම | අර්කාපල්                      |
| *    | ධාවක මගින්              | ගොටුකොළ                       |
| *    | ආගන්තුක අංකුර / මුල්    | රට දෙල් / කරපිංචි             |
| *    | අතු බැඳීම               | අඹ / දෙහි / දොඩම්             |
| *    | බල්බල                   | අත්තාසි                       |

(මින් ඔනෑම 4 ක් ලිවිය හැක.)

+++++

B කොටස - රචනා

01. (a) මෙය පටල දෙකකින් ආවරණය වී ඇත. හරිතලවය තුළ එනම් පංජරය තුළ අභ්‍යන්තර පටල ඇති අතර මේවා මගින් කයිලකොයිඩ සාදයි. කයිලකොයිඩ එන මත එක පිහිටා පංජර කනිකා (ග්‍රැනා) සාදයි. කයිලකොයිඩ එන මත එක පිහිටා පංජර කනිකා (ග්‍රැනා) සාදයි. පංජරය තුළ පිෂ්ඨ කනිකා, රයිබොසෝම DNA හා RNA ඇත. වර්ණක එනම් ක්ලෝරොපිල් හා කැරටිනොයිඩ අභ්‍යන්තර පටලයේ අන්තර්ගත වේ.



- (b) වර්ණක අණු ආලෝක ශක්තිය උරාගනී. රතු (400 - 500 nm) හා නිල් (600 - 700 nm) ආලෝකය ඇති විට ප්‍රභා පද්ධති II හි ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථානයේ ඇති (p680) හරිතප්‍රද අණුවකට ලබා දේ. මෙම ශක්තිය උරාගෙන එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒ ශක්ති මට්ටමකට පත්ව ඉන් ඉවත් වේ. මෙම ඵලදායී ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහක අණු මගින් ලබා ගනී. ඉන් පසු වායු අණු ප්‍රේෂණයක් මඟින් මත් කර අවසානයේ ප්‍රභා පද්ධති I ට ලබා දේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක ශ්‍රේණිය මඟින් ඵලදායී කරන විට යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් පිට වේ. මෙම ශක්තිය ATP සංස්ලේෂණයට යොදා ගනී. මෙය ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ ලෙස හැඳින්වේ.

ප්‍රභාවිච්ඡේදනයෙන් පල අණු බිඳ හෙලයි. මේ නිසා ඇතිවන ඵලදායී ප්‍රභා පද්ධති II p 680 හරිතප්‍රද අණුවෙන් ඉවත්ව ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුව පුරවයි. ප්‍රභාවිච්ඡේදනයේ දී පලයෙන්  $O_2$  නිදහස් වේ.  $(4H_2O \rightarrow 2H_2O + O_2 + 4H^+ + 4e^-)$  ප්‍රභා පද්ධති I හි ඇති P700 හරිතප්‍රද අණුව උද්දීපනය / සැකවුනු විට එහි ඇති ඵලදායී ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහක අණු මත් කර අවසානයේ NADP අණු වලට ලබාදී  $NADPH_2$  ඇති කරයි. ප්‍රභාවිච්ඡේදනයේ දී ඇති වූ ප්‍රෝටෝන ( $H^+$ ) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ දී භාවිතා වේ. මෙහිදී ඇති වූ ATP හා  $NADPH_2$  අණු මගින් ශක්තිය, රසායනික ශක්තිය ලෙස ගෙන යයි.

02. (a) මූලික හෙවත් ප්‍රාථමික පිරියම් කිරීමේ දී විශාල පාවෙන ද්‍රව්‍යය ඉවත් කිරීම, වැලි ඉවත් කිරීම, තෙල් හා ලිපිඩ ඉවත් කිරීම සිදු කෙරෙන අතර අවසාන කාලය තුළ ඝන ද්‍රව්‍යය කැන්පත් වේ. ඊට අමතරව රොන් බොර ඉවත් කෙරේ. මෙහිදී පෙර රසායනික ක්‍රියාකාරීත්වයක් භාවිතා නොවන අතර මූලික පිරියම් කිරීමේ දී ඵලදායී ද්‍රව්‍යය 25- 35% ක ප්‍රමාණයක් ඉවත් කෙරේ.

ප්‍රාථමික පිරියම් කිරීමේ දී පිටතට ගලා යන ද්‍රව්‍යය ද්විතීක පිරියමට භාජනය කෙරේ. මෙහිදී ස්වායු බැක්ටීරියා වර්ධනයක් සිදු කළද එම ඔක්සිකරණයක් පහසු කරලීම සඳහා දූෂිත පලය වාතනය කරනු ලබයි. මේ සඳහා ක්‍රම දෙකක් භාවිතා කෙරේ.

(1) සක්‍රීය බොර ක්‍රමය

(2) කාන්දු පෙරහන් ක්‍රමය

මුල් ක්‍රමයේ දී යාන්ත්‍රිකව සිඳුගෙන වාතනය කෙරේ. දෙවන ක්‍රමයේ දී පාෂාණමය ද්‍රව්‍යය තට්ටුවක් මත දූෂිත පලය සෙමින් ඉසීමට සලසා ඉක්බිති එය කාන්දු වීමට සලසනු ලබයි. මෙම ක්‍රියාවලියේ දී පෙරහන් තට්ටුව මත ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී ඵලදායී ද්‍රව්‍යය ඔක්සිකරණය කරයි.

ද්විතීක පිරියම් ක්‍රියාවලියේදී ඵලදායී ද්‍රව්‍යය 75 - 95% ප්‍රමාණයක් ඔක්සිකරණය කෙරේ.

ද්විතීක පිරියමේ දී ඉවත් වන පලය විෂ බීජ නාෂණය කොට (ක්ලෝරින් යොදා) ස්වභාවික පලය වලට මුදා හැරේ. මෙම පිරියම් ක්‍රම දෙකේදීම ඉතිරිවන රොන් බොර නිර්වායු රොන් බොර ජීර්ණයක් වෙත යවන අතර එහිදී සිදුවන නිර්වායු විශේෂනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජීව වායුව (මීතේන් හා  $CO_2$ ) නිදහස් කරයි. (විශේෂනයේදී ඉතිරිවන රොන් බොර පොහොර ලෙස භාවිතා කරයි.)

- (b) (1) වායුමය වායුමය ජීවීන් පැතිරීම,  
(2) පල දූෂණය  
(3) ජීව දූෂණය කාබනික දූෂණය හා විශෝජක දූෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුවීම,  
(4) මෙවා විශෝජනය වීමට  $O_2$  ප්‍රමාණයක් භාවිත වීම,  
(5) ඒ හේතු කොට පලයේ (BOD) ඉහළ යාම,  
(6) ඒ අනුව පලයේ ජීවීන්ට ( $O_2$  හිම වීම නිසා) හානි සිදුවීම,  
(7) ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්වායු විශෝජක ක්‍රියා නිසා දූෂණ ඇති වීම.

03. චක්‍රගතිය ලක්ෂණ

මෙම පරිසරය අපේක්ෂා කළ හැකි සංසන්දනාත්මකව සමන්විතය. අපේක්ෂා කළ හැකි ප්‍රධාන වේ. මෙම ප්‍රධාන සිදුවීම් (උදාහරණ) වන අතර, ගලා යයි. මෙම ප්‍රධාන ලක්ෂණය 0-40 (ppt) (දාහකට කොටස්) වන අතර, මෙය අධික ලෙස පවතියි. නොහැසිරුණු, පත්ල දක්වා ආලෝකය ව්‍යාප්ත විය. ගංගාවෙන් හා මුහුදෙන් පෝෂණ ලැබීම නිසා පෝෂණ ප්‍රමාණය උසස්ව ඇත. මෙම ජීවීන් මෙම මිනිස් ජීවීන් ද ඇත. මීට අමතරව ස්ථිර කිවුල් දිය වාසය ද ඇත. ජීවීන් අතර ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන, ප්‍රාථමික පරිභෝජක, ද්විතීක පරිභෝජක, තෘතීක පරිභෝජක (ඉහළ මාංශ භක්ෂක) විලෝපයන් හා විශෝජකයින් ඇත.

ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයින් ලෙස ගාසා ප්‍රධාන, මුල් ඇඳ වැඩෙන එසවුණු ගාසා (උදා - කබොලාන), මුල් ඇඳ වැඩෙන නිමර්ණ ගාසා (උදා - මුහුදු තෘණ දත්තට ලැබේ).

ප්‍රාථමික පරිභෝජක ලෙස සත්ත්ව ප්‍රධාන, මත්ස්‍ය, කුස්වේෂියාවුන් දැක්විය හැක. ද්විතීක පරිභෝජක ලෙස විලෝපිත මසුන්, ප්‍රධාන පක්ෂීන් දැක්විය හැක.

මෙහි වාසස්ථාන රාශියකි. එවැනි වාසස්ථාන හා එහි ජීවත්වන ජීවීන් පහත දක්වන පරිදි බෙදා විස්තර කළ හැක.


- ප්‍රධාන මතුපිට සමහර කෘමීන් ජීවත් වේ.
- පල කඳෙහි මත්ස්‍ය / කුස්වේෂියා / ප්‍රධාන ජීවීන් වේ.
- පතුලෙහි සමහර මත්ස්‍යයින් හා මොලස්කාවුන් ජීවත් වේ.
- පතුලේ උපස්ථරය / පස තුළ ඇතැම්විට හා සමහර මොලස්කාවුන් ජීවත් වේ.
- ගාසා මත / ගාසාවලට ඇඳි මොලස්කා හා සිලෙස්ටරේටාවුන් ජීවත් වේ.

මෙම පරිසරයේ කාලාකෘති ලක්ෂණ

අධික නිෂ්පාදනයකින් යුක්තය. අධික පෝෂණ ප්‍රමාණයක් ඇත. කාර්යක්ෂම පෝෂණ වක්‍රීකරණයකි. ආහාර දාම මට්ටම ඉතාමත් ඉහළ යයි. ජීව දේශික ජීවීන් දක්නට ලැබේ. ජීවී - ජීවී අතර මෙන් ම, ජීවීන් හා අපේක්ෂා කළ පරිසරය අතර අන්තර් ක්‍රියා පවතී. විලෝපිත හා මොලස්කා සම්බන්ධතා මෙන් ම සහභෝගී සම්බන්ධතා ද දක්නට ඇත.


04. (a) Ascaris lumbricoides හේ රුපාකාරය

අදාළවූ උල් සිලින්ඩරාකාර දේහයකි. බන්ධන නොපෙන්වයි. සන උච්ච්චයකි. ජායා ජීවීන් පුත් ජීවීන්ට වඩා විශාලයි. පුත් ජීවීන්ගේ අපර කෙළවර වක්‍ර වී ඇත. අපර කෙළවර / ප්‍රතිබාලයේ බලිකා ඇත. පුර්ව කෙළවර මුඛය පිහිටයි. මුඛය, තොල් තුනකින් වට වී ඇත. බහිෂ්ථායී ජීවය පුර්ව කෙළවර ආසන්නයේ ඇත. ♀ ජීවීන්ට බුද්ධියක් ඇති අතර, ♂ ජීවීන්ට ප්‍රතිබාලයක් ඇත. මෙවා එම ජීවීන්ගේ අපර කෙළවර පිහිටයි.



සුහුඹුලන්ගේ රුපාකාරය

ජීවිත චක්‍රය



රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් පරපෝෂිතයින් විසින් පරිසරයට බිත්තර එකතු කිරීම වැළැක්විය හැකි වේ. සතිපාරසාක ක්‍රම පිළිපැදීමෙන්, රෝගය වැළඳීමෙන් වැළකිය හැක. මේ සඳහා (ජල මූලික) වැසිකිළි භාවිතා කිරීම, උණුසුම් නිවා සේ වතුර පානය කිරීම, ආහාර වර්ග මැස්සන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම, ආහාර මත මැස්සන් වැසීමට ඇති අවකාශ වැළැක්වීම, වැසිකිළි යාමෙන් පසු අත් සවිත් යොදා සෝදා ගැනීම, ආහාර ගැනීමට පෙර අත් සවිත් යොදා සෝදා ගැනීම, පත්‍ර සවිත් එළවළු වර්ග නොදිත් සෝදා ආහාරයට ගැනීම, විශේෂයෙන් ම (අමුටෙන් කනු ලබන ආහාර වර්ග) උදා :- ගොවුකොළ / සලාද කොළ ආදිය

මිනිසා අවලංගු වියේ තුළ වේ. එනම් බාහිර පරිසර උෂ්ණත්ව උච්ඡාවචනයෙන් ස්ථායීතාව හමු දේහ උෂ්ණත්වය නියත අගයක තබා ගනී. මෙම නියත උෂ්ණත්ව අගය 37 °C - 36.9 °C පමණ වේ. මේ සඳහා තාප ප්‍රතිග්‍රාහක, තාප ජනක යාන්ත්‍රණ, තාපය ඉවත් කෙරෙන යන්ත්‍රණ හා උෂ්ණත්ව යාමක මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියා කරයි. මෙහි දී - ප්‍රතිපෝෂී යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක වේ. දේහ උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිය විට රුධිරයේ දේහාණු උත්තේජනය වී ස්නායු ආවේග භාවයානි මධ්‍යස්ථාන හා තාප යාමක මධ්‍යස්ථානය වන හයිපොතලාමිකයට ලබා දෙයි. තාප හානි මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය කිරීම ස්වේද ග්‍රන්ථිවල ස්වේද නිෂ්පාදනය වැඩි කරයි. මෙම ස්වේදය වාෂ්ප වීමට අවශ්‍ය තාපය දේහයෙන් උරා ගැනීම හේතු කොට දේහ උෂ්ණත්වය පහළ යාමට හේතුවේ. මීට අමතරව හමේ අවිචල්ය අසලින් පිහිටි රුධිර තාල විස්ථාරණය මගින් නමට සැපයෙන රුධිර ප්‍රමාණය වැඩි කරයි. මේ මගින් උණුසුම් රුධිරයේ සිට හම හරහා විකිරණය මගින් ද සිදුවන තාප හානිය ඉහළ යයි. ඇඩ්‍රිනලින් හයිපොතලික් ප්‍රාථමය පහත හෙලීම මගින් පරිවෘත්තීය ක්‍රියා වේගය පහත වැටීමෙන් තාප ජනනය අඩු කෙරේ.

ඉහත හේතූන් මත දේහ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමට පත්වේ. එසේ දේහ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමට පැමිණීමත් සමඟ සාන්ද්‍ර ප්‍රතිපෝෂණයට අනුව ඉහත යාන්ත්‍රික ක්‍රියාත්මක වීම නතර වේ.

දේහ උෂ්ණත්වය පහළ ගිය විට කුඩුස් අන්ත බල්බ උත්තේජනය වේ. ස්නායු ආවේග තාපලාභී මධ්‍යස්ථාන වෙත ගමන් ගනී. එහි දී තාපලාභී මධ්‍යස්ථාන උත්තේජනය වී දහඩිය දූමිම නිෂේධනය වීමත්, මේ හේතුවෙන් ස්වේද වාෂ්පීභවනය සඳහා දේහයෙන් වැයවන තාප ප්‍රමාණය අඩුවීමත් හමට සැපයෙන රුධිර තාල සංගුලිතයෙන් හම වෙත සැපයෙන රුධිර ප්‍රමාණය පහත වැටීම නිසා විකිරණයෙන් සිදුවන තාප හානිය ද පහළ වැටේ. ඊට අමතරව ඇඩ්‍රිනලීන් හා තයිරොක්සීන් ස්‍රාවය උත්තේජනය වීම නිසා දේහ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවේගය වැඩි වේ. මේ මගින් වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් ජනනය වේ.

ඉහත ක්‍රියා ප්‍රමාණවත් නොවන විට රෝම උද්ගාමක පේශි තදන් සංකෝචනය මගින් ද තාපය ජනනය කරයි. (නිරිංචු පිළිම)

එසේ ම සමායෝජිත නොවූ සැකිලි පේශි සංකෝචනය හෙවත් ටෙඩ්‍රිලිම මගින් ද තාපය ජනනය වේ.

ඉහත ක්‍රියා මගින් දේහ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය මට්ටම දක්වා ඉහළ ගිය විට ඉහත යාන්ත්‍රික ක්‍රියාත්මක වීම නතර වේ. මෙම සියලු ම යන්ත්‍රණ අනිවාර්‍යව සිදුවේ.

06. (a) හයිපොතැලමසය

පූර්ව මස්තිෂ්කයෙන් වර්ධනය වේ. තැලමස මස්තිෂ්කයට විහාම යවන පිරිසුටරිය හා බැඳී පවතී. ස්නායුමය හා අන්තරාසර්‍ය කෘත්‍යයන් ඇත. නිදහස් කිරීමේ හෝමෝන මෙන්ම නිෂේධක ක්‍රියා සඳහා හේතුවන හෝරමෝන ස්‍රාවය කරයි. නිදහස් කිරීමේ හෝරමෝන ලෙස,

TRH, CRH, GnRH, GHRH හා PRH ස්‍රාවය කරයි.

නිෂේධක හෝරමෝන ලෙස GHIH GHRIH හා PIH ස්‍රාවය කරයි.

මත්ස්‍යෝජීන හා ADH සංස්ලේෂණය කරයි.

තාප යාමනයට හෙවත් දේහ උෂ්ණත්ව යාමනයට සහභාගී වේ.

පිපාසය හා බඩගින්න යාමනය කරයි.

විත්ත වේග(බය / සතුට / කෝපය) යාමනය කරයි.

ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය සමඟ සම්බන්ධයි.

(b) හරිතාගාර ආචරණය

මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වායු ගෝලයේ ඇති  $\text{CO}_2$ , ජල වාෂ්ප,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{N}_2\text{O}$  / නයිට්‍රජන්වල මත්ස්‍යය, CFC හා ඕසෝන් වැනි හරිතාගාර වායු මගින් තාප තරංග ආපසු අවකාශයට නිදහස්වීම වළක්වයි. (IR හෙවත් අධෝරක්ත තරංග / දිග තරංග)

වර්තමානයේ පොසිල ඉන්ධන දහනය, වනාන්තර විනාශ කිරීම, සත්ත්ව පාලනය හරිතාගාර ආචරණයට දායක වී ඇත. එනම් හරිතාගාර ආචරණය ඉහළ දූමිමට හේතු වී ඇත. මේ නිසා පෘතුවි ගෝලය උණුසුම් වේ.

ප්‍රතිඵලය වන්නේ ධූවීය අයිස් හා ග්ලැසියර දියවීම, සාගර ජලයේ සිදුවන තාපමය ප්‍රසාරණය යන හේතූන් මත මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළ යාමයි. මීට අමතරව දේශගුණික තත්ත්ව වෙනස් වීම ද හරිතාගාර ආචරණය නිසා සිදුවේ.

(c)  $\text{C}_4$  ශාක

උත්, තම්පලා, බඩ ඉරිඟු ආදී ශාක  $\text{C}_4$  යන්ත්‍රණය පෙන්වයි. මෙම ශාකවල  $\text{CO}_2$  ප්‍රාරම්භය / පළමුවෙන් ප්‍රතික්‍රියණය කරන්නේ පොස්පො ඊනෝල් පයිරුවේට් (PEP) මගිනි.  $\text{CO}_2$  හිර කිරීමෙන් ඇතිවන ප්‍රථම සංයෝගය  $\text{C}_4$  සංයෝගයක් වන මත්සැලෝ ඇසවේට් වීම මෙම ශාක  $\text{C}_4$  ශාක ලෙස හැඳින්වීමට හේතු වේ.

මෙම ශාක වල  $\text{CO}_2$  හිරවීම දෙපියවරකින් සිදු වේ. ඒ ඒ පියවර සඳහා විශේෂණය වූ සෛල දෙවරකක් ඇත.

පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල පළමු පියවර ලෙස  $\text{CO}_2$ , PEP හා බැඳී මත්සැලෝ ඇසවේට් සාදයි. මෙම මත්සැලෝ  $\text{NADPH}_2$  යොදාගෙන මැලේට් බවට මත්සිහරණය වේ. මෙම මැලේට් ජලාස්ම බන්ධන මස්සේ කලාප කොටු සෛල තුළට පරිවහනය කරයි.

කලාප කොටු සෛල තුළ දී මෙම මැලේට් පයිරුවේට් බවට පරිවර්තනය වන අතර, එහි දී  $\text{CO}_2$  නිදහස් වීම හා  $\text{NADPH}_2$  ඇතිවීම සිදු වේ. මෙම නිදහස් වන  $\text{CO}_2$  දෙවන වරට හිර කිරීම RuBP මගින් සිදුවන අතර, එහි දී PGA නිපදවා තැල්වින් චක්‍රය සිදු කරයි. ඉහත ඇති වූ පයිරුවේට් නැවත පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවලට පරිවහනය කරයි. එහි දී නැවත PEP බවට පත්වේ.

$\text{C}_4$  ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය වඩා ආර්යක්ෂමව සිදුවේ. මෙම ශාකවල ප්‍රභාස්වසනය වළක්වයි. එනම් RuBP මත්සිප්පත්

මගින් මත්සිකරණය වීම වළක්වයි.

සනාල කලාප වටා වලයකට කලාප කොටු සෛල පිහිටීම නිසා  $\text{C}_4$  ශාක හඳුනාගත හැකි ය.

